


# Control de emergencia por ataques de asma en el cuidado de niños

## Síntomas de un ataque de asma severo

- silbidos o tos al respirar, la falta de aliento empeora
- el cuello y el pecho del niño se ven más “hundidos” con cada respiración
- el niño tiene dificultad para caminar o hablar
- el niño tiene dificultades para respirar y se encorva o dobla hacia adelante
- el niño se muestra confundido
- Los labios o uñas de la mano del niño están azules, moradas o grisáceas
- el niño muestra algunos de estos síntomas y no tiene medicamento de alivio disponible




## Siga las instrucciones del Plan para el asma del niño

- de el medicamento de alivio rápido indicado en el Plan para el asma del niño
- haga que un adulto permanezca con el niño
- si el niño continúa teniendo dificultad para respirar después de los 5 a 10 minutos de haber recibido su medicamento de rápido alivio, de el medicamento tal como está indicado en el Plan para el niño con asma o llame al 911
- llame al 911 si no hay mejoras después de haber dado el medicamento una segunda vez

## Qué hacer

- pare toda actividad y ayude al niño a sentarse con la espalda derecha
- mantenga la calma y háblele al niño con tranquilidad y seguridad



## Avise

- Llame a los padres del niño y a su doctor para pedir más consejos