

兒童因病 要離開托兒所

在托兒所的幼兒有較高機會患有上呼吸道感染，包括耳炎和暫時的病症，例如濕疹、腹瀉和哮喘以至限制他們的正常活動。大部份的托兒所需要至少為患病的小孩提供臨時照顧。如果小孩在日間有病，托兒所要能夠護理病情而使小孩感到舒適直到家長到達。

作出決定要點

A. 製定條例並知道什麼時候應該靈活應用

許多對於照顧病童的條例是基於對傳染病源，病童的危險，對其它小孩及員工所造成的危險的誤解來設定的。最新的托兒所研究顯示某些病童是不會影響別人健康的。同時，研究顯示把有輕微疾病的小孩留在家中或從托兒所隔離並不能保證其它小孩不會生病。

要求有輕微疾病的小孩離開托兒所的適當理由有：

- 小孩的病是高度傳染性的。
- 小孩感覺不好而不能參加活動。
- 托兒工作者無法照顧病孩。

嚴重程度：

每個決定是根據個案而定的。每個托兒所應該詳細列出可以處理到哪種病情的嚴重程度，並有健康顧問認可的看護計劃。

- 患病的嚴重程度 1：
兒童感覺良好，並有興趣參加活動。因為某些病癥已逐漸消失(例如紅眼病，皮疹或水痘)或病情已開始恢復。在這種情況下，兒童可以參與適當的活動，包括大多數室內和室外的適合他們年齡和智力發育程度的活動。這類兒童不需要特殊照顧。不過要使他們完全康復，還需要讓他們服藥（根據學校條例）和繼續觀察。
- 患病的嚴重程度 2：
兒童因為某些病癥，例如發低燒而表現中等的活動能力。這個小孩可能在患病的初期或在恢復階段。適當的活動包括手工，拼圖遊戲，桌上玩的遊戲，幻想遊戲，並讓他們有機會在房間裡自由活動。
- 患病的嚴重程度 3：
由於某些病癥限制他們的活動能力，兒童的活動能力低。適合他們的只能是睡眠和休息，少食多餐，多喝水，講故事和聽音樂也是可以適當的活動。有些兒童（特別是 3 歲以下）需要身體接觸來安慰，那麼抱一抱或搖動他們。

講義 #19

處理有病或感染疾病的兒童的方法：

在托兒所裡處理患病的兒童並防止疾病傳染的主要方法如下：

- 1) 服食抗生素、作適當的預防或進行免疫注射。
- 2) 把患病或受感染的兒童隔離。
- 3) 選擇另一隔離的場所進行護理（例如兒童自己家裡，或在小型的家庭護理中心，或在兒童所在的托兒所裡提供的另一特定照顧病童的場所。也可以在某一特定照顧病童和殘疾兒童的專用地方）。
- 4) 限制兒童註冊入學。
- 5) 關閉托兒所（罕見的情況下）。

要得到更多有關如何控制某些特定傳染性疾病的資料和建議，請參考附錄 C。

B.托兒所需要考慮的問題

當你需要決定一個輕微患病程度的小孩是否應該繼續留在托兒所時，請提出以下問題：

- **是否有足夠的托兒工作者**(包括義工)來照顧小孩，並為他們改變活動的內容，例如進行一些較安靜的活動、在室內玩耍、和給他們喝足夠的水。
- **托兒工作者是否願意或有能力照顧病童**(為他們擦鼻涕，探熱，提供額外的關懷和愛護)而同時兼顧托兒所裡的其它兒童。
- **是否有一個小房間(一塊小地方)讓有需要的病童休息**。是否有符合加州標準可作為"休息室"的地方給若干兒童同時使用。這個小孩是否對托兒工作者感到熟悉。
- 當無法獲得其它資源時，**父母是否願意支付照顧病童的額外費用**以便在需要時可以僱用多一些員工。
- 在病發之前，**父母有否已作出安排**，一旦他們自己沒有空閑，他們將如何接送和照顧病童。

C.父母需要考慮的問題

當父母決定是否將他們的孩子送到托兒所時，他們必須就許多問題作出衡量，考慮，例如小孩的感受(生理和心理上)，托兒所是否有能力照顧患輕微疾病的小孩，和如需留在家中照顧孩子，他們的收入的損失。